

ইপিআই টিকাদান সময়সূচি (শিশু)

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকার ডোজ	ডোজের সংখ্যা	ডোজের মধ্যে বিরতি	টিকা শুরু করার সঠিক সময়	টিকাদানের স্থান	টিকার প্রয়োগ পথ
শিশুদের যক্ষ্মা	বিসিজি	০.০৫ এম এল	১	-	জন্মের পর থেকে	বাম বাহুর উপরের অংশে	চামড়ার মধ্যে
ডিফথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস-বি ও হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি জনিত রোগসমূহ	পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা (ডিপিটি, হেপাটাইটিস-বি, হিব)	০.৫ এম এল	৩	৪ সপ্তাহ	৬ সপ্তাহ	বাম উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে	মাংসপেশী
নিউমোকোকাস জনতি নিউমোনিয়া	পিসিভি	০.৫ এম এল	৩	৪ সপ্তাহ	৬ সপ্তাহ	ডান উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে	মাংসপেশী
পোলিও মাইলাইটিস	ওপিভি	২ ফোঁটা অথবা (নির্দেশ অনুসারে)	৩	৪ সপ্তাহ	৬ সপ্তাহ	মুখে	মুখে
পোলিও মাইলাইটিস	আইপিভি	০.১ এম এল	২	২২ সপ্তাহ	- ১৪ সপ্তাহ বয়স পূর্ণ হলে - ৯ মাস বয়স পূর্ণ হলে	ডান বাহুর উপরের অংশে	চামড়ার মধ্যে
হাম ও রুবেলা	এমআর টিকা	০.৫ এম এল	২	-	- ৯ মাস বয়স পূর্ণ হলে - ১৫ মাস বয়স পূর্ণ হলে	ডান উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে	চামড়ার নিচে
টাইফয়েড জ্বর	টিসিভি	০.৫ এম এল	১	-	- ১৫ মাস বয়স পূর্ণ হলে	বাম উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে	মাংসপেশী

শিশুর ১৫ মাস বয়স পূর্ণ হলে টিসিভি (১ ডোজ) এবং এমআর টিকা (২য় ডোজ) দিতে হবে। শিশুর জন্মের ১৪ দিনের মধ্যে ওপিভির অতিরিক্ত ডোজ দেয়া যেতে পারে।

উপরের সময়সূচি অনযায়ী সবগুলো টিকার ডোজ শেষ করতে হবে।

ইপিআই টিকাদান সময়সূচি (১০ বছর বয়সী কিশোরী ও ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারী)

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকার ডোজ	ডোজের সংখ্যা	টিকা শুরু করার সঠিক সময়	টিকাদানের স্থান	টিকার প্রয়োগ পথ
ধনুষ্টংকার ও ডিফথেরিয়া	টিডি (টিটেনাস ও ডিফথেরিয়া টক্সয়েড)	০.৫ এম এল	টিডি-১	১৫ বছর বয়স হলেই যথাশীঘ্র	বাহুর উপরের অংশে	মাংশপেশী
			টিডি-২	টিডি-১ পাওয়ার কমপক্ষে ২৮ দিন পর		
			টিডি-৩	টিডি-২ পাওয়ার কমপক্ষে ৬ মাস পর		
			টিডি-৪	টিডি-৩ পাওয়ার কমপক্ষে ১ বৎসর পর		
			টিডি-৫	টিডি-৪ পাওয়ার কমপক্ষে ১ বৎসর পর		
জরায়ুরমূখ ক্যান্সার	এইচপিভি	০.৫ এম এল	১ (এক)	শুধু ১০ বছর বয়সী কিশোরী	বাহুর উপরের অংশে	মাংশপেশী